



Vacuna mixta CPV, CDV, CAV-2, CPIV y Leptospirosis canina

COMPOSICION POR DOSIS (1 ml):

Parvovirus canino atenuado, Cepa C-780916	≥ 10 ⁶ DICT ₅₀
Virus del MOQUILLO Canino atenuado, Cepa lederle	≥ 10 ⁴ DICT ₅₀
Adenovirus Canino tipo 2 atenuado, Adenovirus canino tipo 2 atenuado, Cepa Manhattan	≥ 10 ⁴ DICT ₅₀
Virus Parainfluenza canina atenuada, Cepa Penn 103/70	≥ 10 ⁵ DICT ₅₀
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> inactivada	≥ 10 ⁹ microorg.
<i>Leptospira canicola inactivada</i>	≥ 10 ⁹ microorg.

El Parvovirus Canino (CPV) es agente causal de trastornos digestivos en perros. El Virus del Moquillo Canino (CDV) es el agente etiológico responsable de trastornos nerviosos, respiratorios y diarreas en perros, sobretudo en las primeras semanas de vida. El Adenovirus Canino tipo 1 (CAV-1) es un virus que provoca hepatitis infecciosa canina y puede provocar problemas respiratorios. El Adenovirus Canino tipo 2 (CAV-2) y el virus de la Parainfluenza Canina (CPIV) afectan el sistema respiratorio de los perros infectados. La Leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede afectar el riñón y el hígado de los perros infectados.

La vacunación con **maxivac hepta**[®] permite desarrollar inmunidad en perros susceptibles a la infección por estos agentes infecciosos.

INDICACIONES:

Perros: Prevención de la Parvovirosis, Moquillo, Hepatitis, Laringotraqueítis (producida por el Adenovirus tipo 2), Traqueobronquitis y Leptospirosis (*Leptospira icterohaemorrhagiae* y *Leptospira canicola*), mediante la revacunación anual.

POSOLOGÍA Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar una dosis de 1 ml / perro por vía subcutánea, independientemente de su edad, peso, sexo y raza.

Esta vacuna esta indicada únicamente como revacunación anual en animales previamente inmunizados frente a las enfermedades citadas anteriormente.

CONTRAINDICACIONES:

- No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infecto-contagiosa.
- No administrar en hembras gestantes.

OBSERVACIONES:

- Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse el tratamiento sintomático adecuado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea.

PRECAUCIONES:

- Usar material estéril para su administración.
- Usar la vacuna inmediatamente después de ser reconstituida.
- Conservar la vacuna entre +2 y +8 °C al abrigo de la luz, también durante el transporte. No congelar.
- No mezclar con otras vacunas.
- En caso de inoculación accidental de la persona que administra la vacuna, consultar inmediatamente a un médico y mostrar la etiqueta.
- Una vez usado esterilizar, mediante calor, el frasco y su contenido.

PRESENTACION:

Caja contenido 10 dosis (10 viales de fracción liofilizada + 10 viales de fracción líquida).

USO VETERINARIO

PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg. N° 1.509 ESP.

FABRICANTE Y TITULAR: LABORATORIOS HIPRA S.A

COMERCIALIZADOR: VETERINARIA ESTEVE – LABORATORIOS DR. ESTEVE S.A